

## Pallasova veverica lepotka *Callosciurus erythraeus*

**Opis:** manjša vrsta veverice. Glava in trup merita 20–26 cm, rep je dolg in meri 17–20 cm. Pallasove veverice lepotke imajo zelo različno obarvan kožuh. Hrbtna stran je običajno olivno rjava, trebušna stran pa je lahko rjava ali kostanjevo rjava, včasih z rjavo progo po sredini. V primerjavi s pri nas domorodno rdečo veverico (*Sciurus vulgaris*) ima Pallasova veverica lepotka drugačno obliko glave s strmim čelom. Za razliko od rdeče veverice na ušesih nikoli nima čopkov (rdeča veverica jih ima vse leto, razen v poletnih mesecih). Za razliko od Pallasove veverice, ima rdeča veverica svetlo obarvan trebuh.

**Domovina:** Pallasova veverica lepotka je domorodna v jugovzhodnem delu Azije.

**Razširjenost v Sloveniji:** V Sloveniji ni podatkov o pojavljanju te vrste v naravi.

**Življenjski prostor:** Poseljuje različne tipe gozdov, predvsem listopadne gozdove. Aktivne so zgodaj zjutraj in zvečer.

**Poti vnosa:** Tujerodne populacije izvirajo iz osebkov, ki so pobegnili iz ujetništva (živalski vrtovi, zasebni lastniki).

**Vplivi:** Na Japonskem, kjer je bila naseljena, povzroča škodo v gozdovih z objedanjem lubja. Verjetno je tudi, da prihaja do kompeticije za hrano in gnezditvena mesta z domorodnimi vevericami.

### Literatura:

CABI. (2012). *Callosciurus erythraeus* (Pallas's squirrel). Pridobljeno 24. avgust 2016., od <http://www.cabi.org/isc/datasheet/91200>

UNEP-WCMC. (2010). Review of *Callosciurus erythraeus* and *Sciurus niger*. UNEP-WCMC, Cambridge. Pridobljeno od

[http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/reports/Callosciurus\\_erythraeus\\_Sciurus\\_niger.pdf](http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/reports/Callosciurus_erythraeus_Sciurus_niger.pdf)



Foto: Rollin Verlinde, Vilda Photography