

Seznam bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj za uveljavljanje pravice do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov

VRSTA RAKA	HISTOLOŠKI TIP IN STADIJ RAKA OB POSTAVITVI DIAGNOZE	OBDOBJE OD KONCA AKTIVNEGA ZDRAVLJENJA RAKA, BREZ PONOVIŠČENJA RAKA
Germinalni tumorji	• RAK TESTISA: - Seminomski in neseminomski tumorji, stadij I	3 leta
	- Seminomski in neseminomski tumorji, stadij II-III	5 let
	• IZVENTESTIKULARNI GERMINALNI TUMORJI	5 let
Maligni limfomi	• Difuzni velikocelični limfomi B, vsi podtipi, vsi stadiji	5 let
	• Primarni mediastinalni velikocelični, limfom B, vsi stadiji	5 let
	• Vsi podtipi klasičnega Hodgkinovega limfoma in Hodgkinov limfom tipa nodularne limfocitne predomance, vsi stadiji	5 let
Raki otorinolaringološkega (ORL) področja	• Ploščatocelični in žlezni raki ORL področja, razen:	5 let
	- adenoidnocistični karcinom	7 let
	- karcinom nazofarinksa - olfaktorni nevroblastom	7 let 7 let
Ginekološki raki	• RAK MATERNIČNEGA VRATU: - CIN III (ali HSIL) ali in situ*	0 let
	- FIGO stadij 1A1	3 leta
	- Ostali stadiji	5 let
• DRUGI GINEKOLOŠKI RAKI	5 let	
Rak kože	• MALIGNI MELANOM: - Stadij Tis*	0 let
	- Stadij IA in IB	2 leti
	- Stadij IIA in IIIA	5 let
	• BAZALNOCELIČNI KARCINOM: - Stadij Tis*	0 let
	- Stadij I in II	2 leti
	- Stadij III	5 let
• PLOŠČATOCELIČNI KARCINOM: - Stadij Tis*	0 let	
- Stadij I	2 leti	
- Stadij II	5 let	
Rak ščitnice	• Papilarni in folikularni rak <55 let, stadij I	2 leti
	• Papilarni in folikularni rak 55 let ali več, stadij I ali II	2 leti
	• Papilarni in folikularni rak, stadij III	5 let

Rak urotrakta	• Nizkorizični rak prostate se obravnava enako kot oseba, ki nikoli ni zbolela za rakom, ker je priporočen pristop aktivno sledenje in ne aktivno zdravljenje.	0 let (tj. se ne obravnava kot rak)
	• Rak ledvic	5 let
	• Raki ledvičnega meha in sečevodov	5 let
	• Rak penisa	5 let
	• Rak prostate z izjemo nizkorizičnega raka prostate	5 let
	• Rak sečnega mehurja • Rak sečnice	5 let 5 let
Rak dojke	- DCIS in LCIS*	0 let
	- Stadij I	1 leto
	- Stadij II do III	5 let
Rak centralnega živčnega sistema	• Nizko maligni oziroma benigni možganski tumorji (švanom, meningeom, kraniofaringeom, adenom hipofize, pilocitni astrocitom, cirkumskriptni gliom)	2 leti
Sarkomi	• T1-4 N0 M0, Gradus 1	5 let
Rak pri otrocih in mladih odraslih do starosti 21. leta ob postavitvi diagnoze	• Vse vrste raka in vsi stadiji, razen če ni v prejšnjih vrsticah v tej tabeli določeno krajše obdobje	5 let

Za rake, histološke tipe in stadije raka, ki niso vključeni v ta seznam, velja obdobje sedem let od konca aktivnega zdravljenja v skladu z zakonom, ki ureja pravico oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov.

Za rake, kjer v tem seznamu ni navedenega stadija bolezni, to pomeni, da krajše obdobje velja le za rakave bolezni brez oddaljenih zasevkov.

* Gre za predrakave spremembe ali neinvazivne rake.

OKUŽBA Z VIRUSOM HIV	DRUGI STROKOVNO UTEMELJENI MEDICINSKI POGOJ	OBDOBJE OD ZAČETKA AKTIVNEGA ZDRAVLJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM HIV
Okužba z virusom HIV	Nezaznaven virus HIV v krvi	Zaporednih 6 mesecev, kadarkoli od začetka zdravljenja, v okviru enega leta zdravljenja