



Predsednica Razširjenega strokovnega kolegija
za ginekologijo in porodništvo
Doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med.

Robert Medved, dr. med.
Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. 03. 2020

7. dopisna seja o testiranju nosečnic na COVID-19

Navodilo za odvzem brisa nazofarinksa na SARS-CoV2 pri nosečnicah

Nosečnice s težkimi simptomi bolezni (dispneja, hipoksija, prizadetost pljuč) so obravnavane po protokolu obravnave v bolnišnicah, ki sprejemajo takšne bolnike. Potrebno pa je obvestiti ginekologa.

Vse ostale nosečnice, ki test potrebujejo, se testirajo na vstopnih točkah:

Nosečnice z blagimi simptomi (temperatura, kašelj, boleče žrelo, lahko tudi gastrointestinalni simptomi)

- Testiramo ob pojavu simptomov po splošnih navodilih
 - Test je pozitiven in ni potrebna hospitalizacija
 - Nosečnost 36 tednov ali več
 - Ponovimo 7. dan, če je ta pozitiven ponovimo 14. dan
 - Nosečnost < 36 tednov
 - Testa ne ponavljamo, razen če predvidevamo sprejem v porodnišnico zaradi porodniških indikacij
 - Test je negativen
 - Ne ponavljamo

Asimptomatska nosečnica z znanim pozitivnim izvidom testa na SARS-CoV2

- Ponovimo test 7. dan in ravnamo kot navedeno zgoraj
- Če je minilo od prvega testa > 14 dni, ne ponavljamo, razen ob pojavu simptomov

Asimptomatska nosečnica s tesnim kontaktom (v družini) z okuženim s SARS-CoV2


- Ne testiramo
- Testiramo samo ob pojavu simptomov ali ob sprejemu v porodnišnico (do izvida se obravnava kot okužena)

Asimptomatska nosečnica z manj tesnim kontaktom z okuženim s SARS-CoV2

- Ne testiramo

Usklajeno z infektologom in epidemiologom.

Predsednica RSK za ginekologijo in porodništvo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Premru Sršen', written in a cursive style.

Doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med.