


oseba z znaki okužbe dihal ali oseba s pozitivnim HAT za samotestiranje

oseba z znaki okužbe dihal in tveganjem za težji potek bolezni\* ali oseba z znaki okužbe pred sprejemom v bolnišnico\* ali oseba pred zdravljenjem s paxlovidom\*\*

# Priporočen potek in način testiranja



Vzorci:  
• bris nazofarinksa  
• bris žrela in sprednjega dela nosu (1 palčka)

asimptomatske osebe s pozitivnim HAT (pred ambulantnim pregledom, hospitalizacijo, rezultat testiranja ob izbruhih, rezultat presejalnega testiranja)

asimptomatske osebe pred sprejemom v bolnišnico



Opombe: # - HAT izveden s strani zdravstvene osebe na uradni točki za testiranje  
\* - po presoji zdravnika PCR ali HAT glede na klinično sliko, epidemiološke razmere, stopnjo ogroženosti  
\*\* - upoštevamo priporočila Klinike za infektivne bolezni in vročinska stanja: obvezno PCR, v primeru kratkega časovnega okna, jasne epidemiološke in klinične slike pa izjemoma tudi HAT, ki ga je nato potrebno potrditi s PCR  
\*\*\* - kjer je možno, priporočamo PCR v eni reakciji za SARS-CoV-2, influenco in RSV v sezoni večje pojavnosti virusov influence in drugih respiratornih virusov