



**Domovi za starejše**  
**Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle**  
**Varstveno delovni centri, ki izvajajo institucionalno varstvo**  
**Centri za usposabljanje, delo in varstvo**

Številka: 181-70/2020/1353  
Datum: 10. 2. 2021

**Zadeva:** Informacije za socialno varstvene zavode  
**Zveza:** Dopisi objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje<sup>1</sup>, pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) prejemamo vprašanja različnih deležnikov v povezavi s potrebnimi ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: cepljenje), na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.

## 1. Cepljenje proti SARS-CoV-2

Na ministrstvu s strani različnih deležnikov prejemamo pobude, za spremembo priporočila, da se cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: okužba), izvede čim prej. V povezavi z navedenim pojasnjujemo, da je Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: posvetovalna skupina) dne 18. 1. 2021 sprejela sklep, da se " cepljenje pri prebolelnikih lahko varno odloži do 6 mesecev po začetku bolezni". Sklep temelji na znanstvenih podatkih o trajanju imunosti po preboleli bolezni. V obdobju, ko je razpoložljivih odmerkov cepiva manj kot je potrebnih, je pomembno, da se cepijo najprej tisti, ki so najbolj ogroženi za težji potek bolezni. Navedeno podpirajo tudi začasna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije<sup>2</sup>, iz katerih izhaja, da je pri osebah, ki so okužbo že prebolele, ponovna simptomatska okužba znotraj šest mesecev po preboleli okužbi redka in usmerjajo, da se cepljenje oseb, ki so okužbo že prebolele, lahko odloži proti koncu šestega meseca po preboleli okužbi.

Na ministrstvo smo prejeli vprašanja v povezavi z možnostjo prednostnega cepljenja zunanjih izvajalcev storitev (npr. frizerji, pedikerji ipd.), ki se vključujejo v delo v socialno varstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: SVZ), ter možnosti prednostnega cepljenja kandidatov za sprejem v SVZ (v nadaljnjem besedilu: kandidat).

<sup>1</sup> <https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/>

<sup>2</sup> [https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE\\_recommendation-BNT162b2-2021.1](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1)

Vprašanje smo naslovili na posvetovalno skupino ter prejeli odgovor, da:

- zunanji izvajalci storitev niso kategorija, ki se jo cepi prednostno. Možnost cepljenja se jim omogoči takrat, ko bo cepljenje dostopno tudi za druge nujne službe,
- kandidati, ki bodo v SVZ sprejeti v roku enega meseca, se lahko cepijo prednostno. Cepljenje, ob soglasju kandidata, lahko z osebnim zdravnikom kandidata dogovori odgovorna oseba za zdravstveno nego v SVZ.

**Kot opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje je cepljenje enostaven, varen in učinkovit ukrep za zaščito pred zbolevanjem za koronavirusno boleznijo, ki ne ščiti le cepljenih posameznikov, ampak z zmanjševanjem širjenja nalezljivih bolezni tudi širšo družbo<sup>3</sup>. Vodstva SVZ naprošamo, da dalje promovirajo pomen cepljenja pri zaposlenih in pri uporabnikih.**

## 2. Krizni načrti

Skladno z dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Omogočanje sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva, št. 0075-1/2020/36 z dne 20. 5. 2020, imajo vsi SVZ, ki za svoje uporabnike skladno z 8. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOP DVE) izvajajo tudi zdravstveno dejavnost, vzpostavljeno sivo cono in pripravljen krizni načrt, ki omogoča aktivacijo rdeče cone v 24 urah od ugotovljenega prvega primera okužbe z virusom SARS-CoV-2 (ali druge nalezljive bolezni, ki se prenaša kapljično ali aerogeno) pri uporabniku.

**SVZ prosimo, da nam aktualno verzijo kriznega načrta, s sklicem na številko 181-170/2020 pošljejo na elektronski naslov [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si), in sicer do 19. 2. 2021.**

## 3. Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih

Seznamamo vas, da je posodobljen dokument Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: priporočila), objavljen na spletni strani: <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Izvajalci-zdravstvene-dejavnosti/Domovi-za-starejse-in-drugi-socialno-varstveni-zavodi/Priporocila-za-preprecevanje-in-zajezitev-okuzb-v-socialnovarstvenih-zavodih-9-v2.-2.-2021.pdf>.

V dokument smo dodali poglavje XIV. EVIDENCA SPREMENB DOKUMENTA GLEDE NA PREDHODNO VERZIJO, kar vam bo olajšalo vpogled v aktualne spremembe v priporočilih.

## 4. Mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2

V povezavi s prejetimi vprašanji glede posebnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za zdravstvene delavce in sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v SVZ pojasnjujemo, da pri zaposlenih, ki:

- so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že preboleli, testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: testiranje) ni potrebno 6 mesecev od začetka zdravstvenih težav, ki so bile diagnosticirane kot COVID-19 oziroma od laboratorijsko potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (lahko pa se vezano na občutljivost delovnega okolja in oceno tveganja SVZ odloči tudi drugače),

<sup>3</sup> <https://www.nijz.si/sl/cepljenje-covid>

- so bili v celoti cepljeni (kot celotno cepljenje se šteje 7 dni po cepljenju z drugim odmerkom Pfizer Biontech ali 14 dni po drugem odmerku cepiva Moderna oziroma drugo obdobje skladno z navodili proizvajalca cepiva), testiranje po vzpostavitvi polne zaščite 3 mesece ni potrebno.

Ne glede na prejšnji odstavek, zaposlen, ki je bil v celoti cepljen ali je okužbo že prebolel v primeru pojava simptomov ali znakov koronavirusne bolezni v proces dela ne vstopa in se glede nadaljnjih ukrepov posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom. Smiselno je tudi posvet z infektologom.

V prilogi 1 tega dokumenta prilagamo revidiran Algoritem testiranja na SARS-CoV-2, ki nadomesti algoritem objavljen v dokumentu Informacija v povezavi s testiranjem na SARS-CoV-2, št. 181-70/2020/1299 z dne 11. 1. 2021.

#### **5. Ukrep karantene pri osebi, ki je prebolela okužbo z virusom SARS-CoV-2 oziroma je bila polno cepljena**

Na ministrstvo smo prejeli vprašanje, če morajo osebe, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 prebolele oziroma so že bile v celoti cepljene, v primeru visoko tveganega stika z osebo, pri kateri je postavljen sum na okužbo oziroma okužba z virusom SARS-CoV-2 potrjena, v karanteno.

V povezavi s prejetim vprašanjem pojasnjujemo, da osebi, ki:

- je dokazano prebolela okužbo z virusom SARS-CoV-2 v obdobju 6 mesecev od prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
- osebi, ki je bila v celoti cepljena proti virusu SARS-CoV-2 v obdobju 3 mesece od cepljenja v celoti,

ob visokorizičnem tveganem stiku ni potrebno v karanteno.

#### **6. Usposabljanje na temo uporabe naprav in pripomočkov za dovajanje kisika**

Še vedno imamo možnost SVZ zagotoviti nekaj brezplačnih delavnic za pravilno rokovanje s kisikovimi napravami. Če ste zainteresirani za izvedbo delavnice na lokaciji vašega zavoda, nam to sporočite na elektronski naslov [Marina.Bevanda@gov.si](mailto:Marina.Bevanda@gov.si), najkasneje do 15. 2. 2021.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

**mag. Klavdija KOBAL STRAUS**  
v. d. generalne direktorice


Priloga:

- Algoritem testiranja na SARS-CoV-2

Vročiti:

- Domovi za starejše – po e-pošti
- Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
- Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti
- Varstveno delovni centri – po e-pošti
- Zdravstveni domovi – po e-pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, [gp.mddsz@gov.si](mailto:gp.mddsz@gov.si); [janja.romih@gov.si](mailto:janja.romih@gov.si), [Andrejka.Znoj@gov.si](mailto:Andrejka.Znoj@gov.si), [valentina.vehovar@gov.si](mailto:valentina.vehovar@gov.si), [Mateja.Jenko-Pas@gov.si](mailto:Mateja.Jenko-Pas@gov.si) – po e-pošti
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, [gp.mizs@gov.si](mailto:gp.mizs@gov.si) – po e-pošti
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, [info@ssz-slo.si](mailto:info@ssz-slo.si) – po e-pošti
- Skupnost varstveno delovnih centrov, [skupnostvdcsl@gmail.com](mailto:skupnostvdcsl@gmail.com) – po e-pošti
- Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, [sous@siol.net](mailto:sous@siol.net) – po e-pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, [info@nijz.si](mailto:info@nijz.si), [tatjana.frelj@nijz.si](mailto:tatjana.frelj@nijz.si) – po e-pošti
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, [gp.zirs@gov.si](mailto:gp.zirs@gov.si), [Vera.Ovsenek@gov.si](mailto:Vera.Ovsenek@gov.si) - po e-pošti

TESTIRANJE NA SARS-CoV-2 V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH (SVZ) (algoritem odločanja uporabe PCR/HAT)



\* Največja občutljivost (senzitivnost) hitrega antigenega testa (HAT) je znotraj prvih 5 dni od pojava simptomov oziroma znotraj 7 dni od izpostavljenosti. Če časovni okvir izpostavljenosti ni znan, se testiranje s HAT opravi čim prej. V skladu priporočili Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) je priporočljiva uporaba HAT, ki po navedbah proizvajalca presežejo 90 % občutljivost in 97 % specifičnost.

\*\* Ostali, ki niso bili v visokorizičnem stiku.

Pri asimptomatskih osebah (zaposleni, uporabniki), ki so **okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolele, testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebno 6 mesecev** od začetka zdravstvenih težav, ki so bile diagnosticirane kot COVID-19 oziroma od laboratorijsko potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (lahko pa se vezano na občutljivost delovnega okolja in oceno tveganja SVZ odloči tudi drugače).

Pri asimptomatskih osebah (zaposleni, uporabniki), **ki so bile v celoti cepljene** (kot celotno cepljenje se šteje 7 dni po cepljenju z drugim odmerkom Pfizer Biontech ali 14 dni po drugem odmerku cepiva Moderna oziroma drugo obdobje skladno z navodili proizvajalca cepiva), **testiranje 3 mesece po vzpostavitvi popolne zaščite ni potrebno.**

Če se pri osebi pojavijo simptomi ali znaki COVID-19 v obdobju do 6 mesecev po začetku bolezni ali do 3 mesece po vzpostavitvi popolne zaščite po cepljenju, in so v diferencialni diagnostiki ovrženi drugi vzroki, je smiselno ponovno testiranje s PCR. V primeru pozitivnega izvida je obvezen posvet z infektologom. Zaposleni, pri katerem se pojavijo simptomi ali znaki COVID-19, do razjasnitve v proces dela ne vstopa.