



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Razširjen strokovni kolegij za otorinolaringologijo

Izr. prof. dr. Janez Rebol, dr. med., spec.

ORL

Predsednik RSK za otorinolaringologijo

Klinika za ORL, CFK in MFK UKC Maribor

Ljubljanska c. 5

2000 Maribor

Številka: 3/2021

Datum: 16.2.2021

Zadeva: DOPISNA SEJA RSK ZA OTORINOLARINGOLOGIJO 16.2.2021

Prisotni: izr. prof. dr. Janez Rebol, dr. med., izr. prof. Saba Battelino, dr. med.,

doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med., mag. Božidar Kroflič, dr. med.,

Matjaž Krajnc, dr. med., doc. Aleksandar Aničin, dr. med.

V zadnjem času se je število brisov na Covid 19 povečalo. Celotno preteklo leto so se uspešno jemali brisi iz nazofarinks po vsej Sloveniji. Sedaj se v ambulantah otorinolaringologov pojavlja kar veliko ljudi, ki pridejo z napotnico in želijo namesto iz nazofarinks bris iz farinka z različnimi razlogi. Pogosto to vodi tudi v konfliktne situacije.

Dnevno se na svetu opravi približno 5.1 milijonov testov. Odvzem brisa na SARS-CoV-2 je načeloma varen poseg (neželeni dogodki so bili opisani v 0,026% primerov) (Föh et al. European Respiratory Journal 2020).

Bris orofarinks ima nižjo senzitivnost od brisa nosu in nosno-žrelnega prostora, a ga ob morebitnih kontraindikacijah ali povečani možnosti zapletov priporočajo kot alternativo (Pagella F et al., Orphanet J Rare Dis. 2020).

Vsekakor pa je potrebno bris nosu in nazofarinks opraviti pravilno (Tagliabue. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020)

Člani RSK za otorinolaringologijo sprejmejo zaključek, da so absolutne kontraindikacije za bris iz nazofarinks:

-stanje po endoskopski transnazalni operaciji tumorjev lobanjskega dna,

-stanje po operaciji rinolikvoreje,

-poškodbe lobanjskega dna z ali brez likvoreje

-verificiran Mb. Rendu-Osler

Relativne kontraindikacije za bris iz nazofarinks:

-antikoagulantna terapija,

-stanje po endoskopskih operacijah obnosnih votlin 6 tednov po operaciji (ob pravilnem odvzemenu, kjer sonda drsi po nosnem dnu, je možnost zapletov minimalna)

Priporočamo, da se bris odvzame iz ene - boljše prehodne nosnice. V primeru navedenih kontraindikacij, pa priporočamo odvzem brisa nosnega dela žrela transoralno.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:

Izr. prof. dr. Janez Rebol, dr. med.,
specialist otorinolaringologije
Predsednik RSK za otorinolaringologijo

