

Bolezen modrikastega jezika

PRIPOROČILA IMETNIKOM ŽIVALI

Pred izvedbo cepljenja poskrbite, da so vaše živali označene.

Pri izvedbi cepljenja sodelujte z veterinarji.

Bodite pozorni na prisotnost kliničnih znakov pri živalih, predvsem v primeru nakupa novih živali.

Vsak sum, da se je bolezen pojavila v reji, takoj sporočite najbližji veterinarski organizaciji.

Upoštevajte biovarnostne ukrepe ter bodite pozorni na izvor živali.

Informacije o bolezni, pogojih za premike živali z območij z omejitvami ter o programu cepljenja so dostopne na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: <http://www.uvhvvr.gov.si/>.



Informacije o cepljenju goveda in drobnice

Bolezen modrikastega jezika

Bolezen modrikastega jezika (BT) je virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev. Širi se s piki krvosesnih mušic iz rodu *Culicoides*. Mušice, ki prenašajo bolezen, so najbolj aktivne v obdobju od aprila do decembra, zato se tudi bolezen pojavlja sezonsko. Poznanih je več serotipov virusa BT (BTV 1 do 27).

Novembra 2015 je bila bolezen (serotip BTV 4) prvič potrjena tudi v Sloveniji na območju Prekmurja, v letu 2016 pa se je pojavila in razširila v južnem delu Slovenije.

Namen cepljenja

Ko je bolezen enkrat prisotna v državi, je najučinkovitejši oziroma edini ukrep za izkoreninjenje boleznih zaščitno cepljenje.

Za učinkovito zaščito morata biti govedo in drobnica cepljena v času, ki zagotavlja nastanek imunosti še pred začetkom sezone aktivnosti vektorjev, ki bolezen širijo. To je predvidoma v drugi polovici aprila.

Cepljenje se bo izvajalo pri govedu in drobnici na območju z omejitvami, to je na celotnem ozemlju Slovenije.

Cepljenje bodo izvajale veterinarske organizacije s koncesijo.

Cepljenje pri govedu

Cepljenje se bo izvedlo v dveh krogih. Prvi krog bo potekal od 1. januarja do 31. marca. V tem obdobju bo cepljeno vse govedo, starejše od enega meseca.

Drugi krog cepljenja bo potekal od 1. junija do 31. julija. Predvidoma bodo v tem krogu zajete vse živali, ki v prvem krogu še niso bile dovolj stare za cepljenje.

Za učinkovito zaščito pri govedu sta potrebna dva odmerka cepiva v razmiku 21 do 28 dni.



Cepljenje pri govedu in drobnici se bo izvajalo na celotnem ozemlju Slovenije.



Otečene ustnice, modrikast jezik in otekline glave pri oboleli ovci



Cepljenje bodo izvajale veterinarske organizacije s koncesijo.



Za učinkovito zaščito pri govedu sta potrebna dva odmerka cepiva.



Cepljenje goveda in drobnice se bo izvedlo v dveh krogih.



Vse živali morajo biti pred cepljenjem individualno označene.



Cepijo se živali, ki so že dopolnile en mesec.

Cepljenje pri drobnici (ovce in koze)

Tako kot pri govedu, se bo tudi pri drobnici cepljenje izvedlo v dveh krogih.

Za učinkovito zaščito je pri ovcah potreben en odmerek cepiva. Imunost nastopi po 21 dneh.

Za učinkovito zaščito pri kozah sta, tako kot pri govedu, potrebna dva odmerka cepiva.

Vse živali morajo biti pred cepljenjem individualno označene.

Označitev živali

Govedo in drobnica morajo biti pred cepljenjem individualno označeni.

Če ob cepljenju živali še niso označene, jih je treba najprej označiti in registrirati, šele potem opraviti cepljenje.

Živali morajo biti individualno označene z ušesnimi številkami, kot so določene v predpisih o identifikaciji in registraciji.

Pogoji za premike živali z območja cepljenja ter cepljenih živali

Premiki cepljenih živali znotraj območja z omejitvami in na prosta območja oziroma na območja, kjer kroži drug serotip virusa, se izvajajo v skladu z Uredbo (EK) št. 1266/2007 – 7. in 8. člen, Priloga III.

Če so živali cepljene, se lahko trgovanje z vsemi kategorijami živali (zakol, pleme, proizvodnja) izvaja ne glede na obdobje aktivnosti vektorjev.

Preiskave pred premiki niso potrebne.