

Klinični znaki bolezni modrikastega jezika (BT)

VIR:



Institute for Animal Health (IAH), Pirbright, Velika Britanija
EU referenčni laboratorij za bolezen modrikastega jezika

- Blagi klinični znaki
 - šest dni po infekciji (d.p.i.):
 - apatija
 - depresija
 - povišana telesna temperatura
 - začetek konjunktivitisa



- hiperemija
- začetek vnetja dlesni ter ustne in nosne sluznice
- 6 d.p.i.



- hiperemija nosne in ustne sluznice
- edem in oteklina glave
- 6 d.p.i.



©IAH 2006



©IAH 2006

- Zmerni klinični znaki
 - osem dni po infekciji (d.p.i.):
 - konjunktivitis
 - solzenje



- hiperemija in vnetje nosne in ustne sluznice
- močan nosni izcedek
- edem glave - predvsem v predelu nosu in ust
- 8 d.p.i.



- zmerno vnetje svitka
- področje nad parkljem hiperemično in vneto
- parkelj je na otip vroč
- 10 d.p.i.



- Izraziti klinični znaki
 - šest dni po infekciji (d.p.i.)
 - močno slinjenje
 - oteženo dihanje



©IAH 2006



©IAH 2006

- hude respiratorne težave
- težko dihanje in dušenje zaradi goste pene in edemov v respiratornem sistemu
- posledično cianoza jezika
- 6 d.p.i.



- huda oteklina jezika
- edem glave
- vnetje svitka

