

Čebele!

POZOR

Uporabniki fitofarmaceutskih sredstev upoštevajmo sledeče:

ŠKROPLJENJE ali **PRŠENJE** rastlin s fitofarmaceutskimi pripravki

- v času cvetenja praviloma ne škropimo s fitofarmaceutskimi pripravki (FFS)
- če je ob cvetenju nujno potrebno zatirati bolezni ali škodljivce, opravimo škropljenje takrat, ko čebele niso na paši in to s pripravki, ki niso nevarni za čebele
- pred uporabo čebelam nevarnih FFS odstranimo cvetočo podrast
- preprečimo zanašanje FFS na sosednje parcele
- ne škropimo v vročini nad 25 °C
- dosledno upoštevajmo navodila za uporabo FFS
- vzpostavimo vzajemno sodelovanje s čebelarji



SETEV KORUZE tretirane z insekticidi

- dodelano seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne sme ponovno tretirati z istimi ali dodatnimi FFS.
- pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati opozorila in obvestila na etiketi o osebni zaščiti, varovanju okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati.
- setev tretiranega semena koruze s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami se sme izvajati le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku izstopajočega zraka v okolico. Naprava usmerja tok zraka čim bližje k tlom.
- pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena.
- setev izvesti v skladu z dobro kmetijsko prakso na način, ki preprečuje morebitno zanašanje FFS s semena na sosednje parcele ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra.
- ne sejmo v zelo suhem in vetrovnem vremenu; počakajmo, da se veter umiri.
- če je v času setve na sosednjih parcelah katera koli rastlina, ki jo obiskujejo čebele, moramo biti še bolj pozorni in dosledno izvajati vse ukrepe, ki preprečijo odnašanje prahu.
- izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

