

**PRILOGA 1: Slikovno gradivo - značilnosti bakterije in znamenja okužbe.**



Gram negativna bakterija.



Prenos možen z žuželkami (čebele).



Značilno sušenje poganjkov in listnih šopov ter plodov.



Okužba preko naravnih odprtín in rakastih ran.



Razpoke in rakaste rane na lesu, nekrotično obarvan žilni kambij ob odstranitvi luba.



Pojav eksudata: brezbarvni do mlečno bel bakterijski izcedek.



Hrušev ožig na glogu.



Ožig vej.



Okužba cvetov na jablani: voden videz, hitro venenje, rjavenje in sušenje cvetov in cvetnih šopov.



Kljukasto ukrivljeni vršiček poganjka, ki spominja na pastirsko palico.



Pastirska palica z eksudatom.



Sekundarno cvetenje posredno vpliva na širjenje okužbe.

**PRILOGA 2: Slikovno gradivo - gostiteljske rastline.**



**jablana – *Malus domestica***

**Sadne rastline**



**hruška – *Pyrus communis***



**naši – *Pyrus pyrifolia***



**nešplja - *Mespilus***



**kutina - *Cydonia***



**skorš - *Sorbus***

**Okrasne rastline**



**japonska kutina - *Chaenomeles***



**šmarna hrušica - *Amelanchier***



**glog - *Crataegus***



**panešlja - *Cotoneaster***



**ognjeni trn - *Pyracantha***



**fotinia – *Photinia davidiana***



**japonska nešplja - *Eriobotrya***